

問15 ストレスの有無

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 大いに感じた	268	21.5	26	32.9	58	36.5	58	28.0	53	31.2	25	9.4	45	12.7
2 多少感じた	585	47.0	36	45.6	69	43.4	108	52.2	93	54.7	132	49.4	145	41.0
3 あまり感じなかった	316	25.4	15	19.0	29	18.2	35	16.9	21	12.4	88	33.0	126	35.6
4 まったく感じなかった	66	5.3	2	2.5	3	1.9	4	1.9	3	1.8	22	8.2	32	9.0
無回答	9	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 大いに感じた	94	16.7	5	20.0	24	38.1	20	22.7	22	28.9	9	6.9	13	7.3
2 多少感じた	251	44.7	12	48.0	21	33.3	45	51.1	44	57.9	55	42.0	74	41.8
3 あまり感じなかった	165	29.4	7	28.0	16	25.4	19	21.6	7	9.2	51	38.9	64	36.2
4 まったく感じなかった	47	8.4	1	4.0	2	3.2	4	4.5	3	3.9	16	12.2	21	11.9
無回答	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 大いに感じた	174	25.7	21	38.9	34	35.4	38	31.9	31	33.0	16	11.9	32	18.1
2 多少感じた	332	49.0	24	44.4	48	50.0	63	52.9	49	52.1	77	57.0	71	40.1
3 あまり感じなかった	149	22.0	8	14.8	13	13.5	16	13.4	14	14.9	36	26.7	62	35.0
4 まったく感じなかった	19	2.8	1	1.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	6	4.4	11	6.2
無回答	4	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.6
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問16 睡眠での休養の状況

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 十分とれている	320	25.7	21	26.6	31	19.5	40	19.3	29	17.1	63	23.6	135	38.1
2 まあまあとれている	690	55.5	38	48.1	90	56.6	114	55.1	98	57.6	161	60.3	185	52.3
3 あまりとれていない	210	16.9	18	22.8	35	22.0	46	22.2	39	22.9	42	15.7	28	7.9
4 まったくとれていない	18	1.4	2	2.5	3	1.9	6	2.9	3	1.8	1	0.4	3	0.8
無回答	6	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0	3	0.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 十分とれている	169	30.1	5	20.0	14	22.2	18	20.5	15	19.7	36	27.5	80	45.2
2 まあまあとれている	292	52.0	15	60.0	30	47.6	46	52.3	43	56.6	74	56.5	83	46.9
3 あまりとれていない	91	16.2	5	20.0	19	30.2	20	22.7	16	21.1	20	15.3	11	6.2
4 まったくとれていない	8	1.4	0	0.0	0	0.0	4	4.5	2	2.6	1	0.8	1	0.6
無回答	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 十分とれている	150	22.1	16	29.6	17	17.7	22	18.5	14	14.9	26	19.3	55	31.1
2 まあまあとれている	395	58.3	23	42.6	60	62.5	68	57.1	55	58.5	87	64.4	102	57.6
3 あまりとれていない	119	17.6	13	24.1	16	16.7	26	21.8	23	24.5	22	16.3	17	9.6
4 まったくとれていない	10	1.5	2	3.7	3	3.1	2	1.7	1	1.1	0	0.0	2	1.1
無回答	4	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	0	0.0	1	0.6
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問17 悩みなどがあるときの相談先

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 家族(親戚を含む)	868	69.8	55	69.6	118	74.2	146	70.5	115	67.6	193	72.3	237	66.9
2 友人	432	34.7	54	68.4	67	42.1	82	39.6	66	38.8	90	33.7	72	20.3
3 職場関係者	146	11.7	16	20.3	34	21.4	45	21.7	32	18.8	14	5.2	4	1.1
4 その他	67	5.4	5	6.3	6	3.8	3	1.4	4	2.4	14	5.2	35	9.9
5 相談できる人はいない	113	9.1	2	2.5	15	9.4	22	10.6	14	8.2	19	7.1	39	11.0
無回答	24	1.9	0	0.0	2	1.3	2	1.0	1	0.6	3	1.1	15	4.2
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	132.6	79	167.1	159	152.2	207	144.8	170	136.4	267	124.6	354	113.4

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 家族(親戚を含む)	373	66.4	11	44.0	43	68.3	57	64.8	49	64.5	91	69.5	121	68.4
2 友人	102	18.1	21	84.0	11	17.5	18	20.5	13	17.1	25	19.1	14	7.9
3 職場関係者	63	11.2	4	16.0	16	25.4	20	22.7	10	13.2	9	6.9	3	1.7
4 その他	29	5.2	2	8.0	2	3.2	0	0.0	3	3.9	8	6.1	14	7.9
5 相談できる人はいない	80	14.2	1	4.0	12	19.0	16	18.2	11	14.5	13	9.9	26	14.7
無回答	15	2.7	0	0.0	2	3.2	1	1.1	1	1.3	2	1.5	9	5.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	117.8	25	156.0	63	136.6	88	127.3	76	114.5	131	113.0	177	105.7

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 家族(親戚を含む)	492	72.6	44	81.5	75	78.1	89	74.8	66	70.2	101	74.8	116	65.5
2 友人	329	48.5	33	61.1	56	58.3	64	53.8	53	56.4	65	48.1	58	32.8
3 職場関係者	83	12.2	12	22.2	18	18.8	25	21.0	22	23.4	5	3.7	1	0.6
4 その他	38	5.6	3	5.6	4	4.2	3	2.5	1	1.1	6	4.4	21	11.9
5 相談できる人はいない	33	4.9	1	1.9	3	3.1	6	5.0	3	3.2	6	4.4	13	7.3
無回答	9	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	6	3.4
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	145.1	54	172.3	96	162.5	119	157.9	94	154.3	135	136.1	177	121.5

問18 ストレス解消法の有無

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 はい	985	79.2	67	84.8	134	84.3	168	81.2	137	80.6	214	80.1	262	74.0
2 いいえ	237	19.1	12	15.2	24	15.1	36	17.4	33	19.4	52	19.5	76	21.5
無回答	22	1.8	0	0.0	1	0.6	3	1.4	0	0.0	1	0.4	16	4.5
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 はい	430	76.5	21	84.0	50	79.4	70	79.5	61	80.3	101	77.1	126	71.2
2 いいえ	123	21.9	4	16.0	13	20.6	17	19.3	15	19.7	29	22.1	44	24.9
無回答	9	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.8	7	4.0
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 はい	552	81.4	46	85.2	84	87.5	98	82.4	76	80.9	112	83.0	136	76.8
2 いいえ	113	16.7	8	14.8	11	11.5	19	16.0	18	19.1	23	17.0	32	18.1
無回答	13	1.9	0	0.0	1	1.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	9	5.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問19 アルコール摂取頻度

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 週6日～7日飲む	262	21.1	4	5.1	17	10.7	45	21.7	47	27.6	73	27.3	73	20.6
2 週3日～5日飲む	110	8.8	2	2.5	13	8.2	17	8.2	22	12.9	30	11.2	26	7.3
3 週1日～2日飲む	212	17.0	23	29.1	40	25.2	49	23.7	29	17.1	34	12.7	36	10.2
4 飲まない	633	50.9	49	62.0	87	54.7	95	45.9	72	42.4	125	46.8	202	57.1
無回答	27	2.2	1	1.3	2	1.3	1	0.5	0	0.0	5	1.9	17	4.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 週6日～7日飲む	194	34.5	4	16.0	12	19.0	30	34.1	30	39.5	53	40.5	63	35.6
2 週3日～5日飲む	71	12.6	1	4.0	6	9.5	10	11.4	17	22.4	17	13.0	20	11.3
3 週1日～2日飲む	103	18.3	9	36.0	19	30.2	25	28.4	10	13.2	19	14.5	21	11.9
4 飲まない	184	32.7	11	44.0	24	38.1	23	26.1	19	25.0	39	29.8	68	38.4
無回答	10	1.8	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	3	2.3	5	2.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 週6日～7日飲む	66	9.7	0	0.0	5	5.2	15	12.6	17	18.1	19	14.1	10	5.6
2 週3日～5日飲む	39	5.8	1	1.9	7	7.3	7	5.9	5	5.3	13	9.6	6	3.4
3 週1日～2日飲む	109	16.1	14	25.9	21	21.9	24	20.2	19	20.2	15	11.1	15	8.5
4 飲まない	447	65.9	38	70.4	63	65.6	72	60.5	53	56.4	86	63.7	134	75.7
無回答	17	2.5	1	1.9	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.5	12	6.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問19付問 アルコール摂取量

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 酒1合未満	286	49.0	13	44.8	39	55.7	53	47.7	46	46.9	65	47.4	68	50.4
2 酒1合～2合未満	185	31.7	9	31.0	21	30.0	39	35.1	29	29.6	41	29.9	44	32.6
3 酒2合～3合未満	73	12.5	3	10.3	4	5.7	11	9.9	20	20.4	22	16.1	13	9.6
4 酒3合以上	21	3.6	2	6.9	4	5.7	5	4.5	3	3.1	5	3.6	2	1.5
無回答	19	3.3	2	6.9	2	2.9	3	2.7	0	0.0	4	2.9	8	5.9
n(回答者数)/構成比(%)の合計	584	100.0	29	100.0	70	100.0	111	100.0	98	100.0	137	100.0	135	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 酒1合未満	139	37.8	5	35.7	19	51.4	24	36.9	20	35.1	26	29.2	45	43.3
2 酒1合～2合未満	144	39.1	6	42.9	14	37.8	27	41.5	19	33.3	35	39.3	41	39.4
3 酒2合～3合未満	59	16.0	1	7.1	1	2.7	9	13.8	15	26.3	21	23.6	12	11.5
4 酒3合以上	18	4.9	1	7.1	3	8.1	4	6.2	3	5.3	5	5.6	2	1.9
無回答	8	2.2	1	7.1	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	2.2	4	3.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	368	100.0	14	100.0	37	100.0	65	100.0	57	100.0	89	100.0	104	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 酒1合未満	145	67.8	8	53.3	20	60.6	29	63.0	26	63.4	38	80.9	23	74.2
2 酒1合～2合未満	41	19.2	3	20.0	7	21.2	12	26.1	10	24.4	6	12.8	3	9.7
3 酒2合～3合未満	14	6.5	2	13.3	3	9.1	2	4.3	5	12.2	1	2.1	1	3.2
4 酒3合以上	3	1.4	1	6.7	1	3.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	11	5.1	1	6.7	2	6.1	2	4.3	0	0.0	2	4.3	4	12.9
n(回答者数)/構成比(%)の合計	214	100.0	15	100.0	33	100.0	46	100.0	41	100.0	47	100.0	31	100.0

問20 喫煙の状況

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 吸っている	136	10.9	9	11.4	24	15.1	19	9.2	21	12.4	36	13.5	26	7.3
2 以前吸っていたが、やめた	231	18.6	6	7.6	24	15.1	35	16.9	38	22.4	53	19.9	74	20.9
3 吸わない	864	69.5	64	81.0	110	69.2	152	73.4	111	65.3	176	65.9	246	69.5
無回答	13	1.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	0	0.0	2	0.7	8	2.3
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 吸っている	109	19.4	8	32.0	18	28.6	15	17.0	14	18.4	31	23.7	23	13.0
2 以前吸っていたが、やめた	183	32.6	3	12.0	10	15.9	25	28.4	34	44.7	43	32.8	67	37.9
3 吸わない	265	47.2	14	56.0	34	54.0	48	54.5	28	36.8	56	42.7	84	47.5
無回答	5	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	1.7
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 吸っている	26	3.8	1	1.9	6	6.3	4	3.4	7	7.4	5	3.7	3	1.7
2 以前吸っていたが、やめた	47	6.9	3	5.6	14	14.6	10	8.4	4	4.3	9	6.7	7	4.0
3 吸わない	597	88.1	50	92.6	76	79.2	104	87.4	83	88.3	120	88.9	162	91.5
無回答	8	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	5	2.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問20付問1 同居者の中に妊婦や20歳未満の子どもがいるか

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 いる	39	28.7	2	22.2	16	66.7	12	63.2	5	23.8	3	8.3	1	3.8
2 いない	95	69.9	7	77.8	8	33.3	7	36.8	16	76.2	32	88.9	24	92.3
無回答	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	3.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	136	100.0	9	100.0	24	100.0	19	100.0	21	100.0	36	100.0	26	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 いる	30	27.5	2	25.0	13	72.2	9	60.0	4	28.6	2	6.5	0	0.0
2 いない	78	71.6	6	75.0	5	27.8	6	40.0	10	71.4	28	90.3	23	100.0
無回答	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0
n(回答者数)/構成比(%)の合計	109	100.0	8	100.0	18	100.0	15	100.0	14	100.0	31	100.0	23	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 いる	9	34.6	0	0.0	3	50.0	3	75.0	1	14.3	1	20.0	1	33.3
2 いない	16	61.5	1	100.0	3	50.0	1	25.0	6	85.7	4	80.0	1	33.3
無回答	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3
n(回答者数)/構成比(%)の合計	26	100.0	1	100.0	6	100.0	4	100.0	7	100.0	5	100.0	3	100.0

問20付問2 禁煙の意思の有無

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 1か月以内に禁煙しようと思っている	5	3.7	1	11.1	1	4.2	0	0.0	0	0.0	3	8.3	0	0.0
2 6か月以内に禁煙しようと思うが、1か月以内に禁煙するつもりはない	5	3.7	2	22.2	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	2.8	1	3.8
3 禁煙に関心はあるが、今すぐ禁煙しようとは思わない	74	54.4	5	55.6	10	41.7	13	68.4	14	66.7	17	47.2	15	57.7
4 禁煙のことはまだ考えていない	50	36.8	1	11.1	13	54.2	4	21.1	7	33.3	15	41.7	9	34.6
無回答	2	1.5	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	3.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	136	100.0	9	100.0	24	100.0	19	100.0	21	100.0	36	100.0	26	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 1か月以内に禁煙しようと思っている	5	4.6	1	12.5	1	5.6	0	0.0	0	0.0	3	9.7	0	0.0
2 6か月以内に禁煙しようと思うが、1か月以内に禁煙するつもりはない	4	3.7	1	12.5	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	3.2	1	4.3
3 禁煙に関心はあるが、今すぐ禁煙しようとは思わない	56	51.4	5	62.5	6	33.3	10	66.7	9	64.3	12	38.7	14	60.9
4 禁煙のことはまだ考えていない	44	40.4	1	12.5	11	61.1	4	26.7	5	35.7	15	48.4	8	34.8
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
n(回答者数)/構成比(%)の合計	109	100.0	8	100.0	18	100.0	15	100.0	14	100.0	31	100.0	23	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 1か月以内に禁煙しようと思っている	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 6か月以内に禁煙しようと思うが、1か月以内に禁煙するつもりはない	1	3.8	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 禁煙に関心はあるが、今すぐ禁煙しようとは思わない	18	69.2	0	0.0	4	66.7	3	75.0	5	71.4	5	100.0	1	33.3
4 禁煙のことはまだ考えていない	5	19.2	0	0.0	2	33.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	33.3
無回答	2	7.7	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3
n(回答者数)/構成比(%)の合計	26	100.0	1	100.0	6	100.0	4	100.0	7	100.0	5	100.0	3	100.0

問21 禁煙するために利用できるものの認知状況

(複数回答)	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 医療機関の禁煙外来	738	59.3	61	77.2	123	77.4	169	81.6	130	76.5	146	54.7	107	30.2
2 健康センターの禁煙チャレンジセミナー	112	9.0	3	3.8	15	9.4	26	12.6	10	5.9	29	10.9	28	7.9
3 禁煙補助剤(ニコチンガム・ニコチンパッチ)	744	59.8	66	83.5	128	80.5	169	81.6	130	76.5	144	53.9	104	29.4
4 その他	62	5.0	4	5.1	6	3.8	5	2.4	6	3.5	13	4.9	27	7.6
無回答	375	30.1	7	8.9	23	14.5	25	12.1	29	17.1	93	34.8	194	54.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	163.2	79	178.5	159	185.6	207	190.3	170	179.5	267	159.2	354	129.9

(複数回答)	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 医療機関の禁煙外来	330	58.7	20	80.0	50	79.4	65	73.9	59	77.6	72	55.0	63	35.6
2 健康センターの禁煙チャレンジセミナー	66	11.7	2	8.0	8	12.7	13	14.8	7	9.2	19	14.5	17	9.6
3 禁煙補助剤(ニコチンガム・ニコチンパッチ)	339	60.3	21	84.0	49	77.8	67	76.1	62	81.6	73	55.7	66	37.3
4 その他	37	6.6	0	0.0	4	6.3	1	1.1	3	3.9	9	6.9	19	10.7
無回答	149	26.5	2	8.0	9	14.3	14	15.9	9	11.8	38	29.0	77	43.5
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	163.8	25	180.0	63	190.5	88	181.8	76	184.1	131	161.1	177	136.7

(複数回答)	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 医療機関の禁煙外来	408	60.2	41	75.9	73	76.0	104	87.4	71	75.5	74	54.8	44	24.9
2 健康センターの禁煙チャレンジセミナー	46	6.8	1	1.9	7	7.3	13	10.9	3	3.2	10	7.4	11	6.2
3 禁煙補助剤(ニコチンガム・ニコチンパッチ)	404	59.6	45	83.3	79	82.3	102	85.7	68	72.3	71	52.6	38	21.5
4 その他	24	3.5	4	7.4	2	2.1	4	3.4	3	3.2	3	2.2	8	4.5
無回答	224	33.0	5	9.3	14	14.6	11	9.2	20	21.3	55	40.7	117	66.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	163.1	54	177.8	96	182.3	119	196.6	94	175.5	135	157.7	177	123.2

問22ア 喫煙が影響を及ぼす病気の認知度:肺がん

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	1,060	85.2	72	91.1	145	91.2	200	96.6	159	93.5	217	81.3	262	74.0
2 どちらともいえない	74	5.9	3	3.8	8	5.0	4	1.9	8	4.7	22	8.2	29	8.2
3 たばこと関係ない	5	0.4	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.6
4 病気を知らない	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
無回答	103	8.3	4	5.1	4	2.5	3	1.4	3	1.8	27	10.1	59	16.7
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	473	84.2	21	84.0	55	87.3	84	95.5	75	98.7	99	75.6	137	77.4
2 どちらともいえない	38	6.8	3	12.0	4	6.3	2	2.3	0	0.0	15	11.5	14	7.9
3 たばこと関係ない	4	0.7	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.6
4 病気を知らない	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
無回答	46	8.2	1	4.0	2	3.2	2	2.3	1	1.3	16	12.2	24	13.6
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	585	86.3	51	94.4	90	93.8	116	97.5	84	89.4	117	86.7	125	70.6
2 どちらともいえない	36	5.3	0	0.0	4	4.2	2	1.7	8	8.5	7	5.2	15	8.5
3 たばこと関係ない	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
4 病気を知らない	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
無回答	55	8.1	3	5.6	2	2.1	1	0.8	2	2.1	11	8.1	35	19.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問22イ 喫煙が影響を及ぼす病気の認知度:喉頭がん

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	843	67.8	59	74.7	123	77.4	172	83.1	127	74.7	168	62.9	191	54.0
2 どちらともいえない	209	16.8	14	17.7	23	14.5	24	11.6	36	21.2	60	22.5	52	14.7
3 たばこと関係ない	20	1.6	1	1.3	1	0.6	5	2.4	3	1.8	4	1.5	6	1.7
4 病気を知らない	12	1.0	1	1.3	4	2.5	1	0.5	0	0.0	1	0.4	5	1.4
無回答	160	12.9	4	5.1	8	5.0	5	2.4	4	2.4	34	12.7	100	28.2
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	387	68.9	19	76.0	49	77.8	73	83.0	59	77.6	78	59.5	107	60.5
2 どちらともいえない	100	17.8	5	20.0	11	17.5	10	11.4	13	17.1	34	26.0	27	15.3
3 たばこと関係ない	8	1.4	0	0.0	1	1.6	2	2.3	3	3.9	0	0.0	2	1.1
4 病気を知らない	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.1
無回答	64	11.4	1	4.0	2	3.2	3	3.4	1	1.3	18	13.7	39	22.0
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	455	67.1	40	74.1	74	77.1	99	83.2	68	72.3	89	65.9	84	47.5
2 どちらともいえない	109	16.1	9	16.7	12	12.5	14	11.8	23	24.5	26	19.3	25	14.1
3 たばこと関係ない	12	1.8	1	1.9	0	0.0	3	2.5	0	0.0	4	3.0	4	2.3
4 病気を知らない	9	1.3	1	1.9	4	4.2	1	0.8	0	0.0	0	0.0	3	1.7
無回答	93	13.7	3	5.6	6	6.3	2	1.7	3	3.2	16	11.9	61	34.5
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問22ウ 喫煙が影響を及ぼす病気の認知度:ぜんそく

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	815	65.5	48	60.8	115	72.3	154	74.4	116	68.2	180	67.4	199	56.2
2 どちらともいえない	195	15.7	22	27.8	27	17.0	29	14.0	37	21.8	35	13.1	45	12.7
3 たばこと関係ない	89	7.2	5	6.3	10	6.3	17	8.2	13	7.6	22	8.2	22	6.2
4 病気を知らない	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.6
無回答	142	11.4	4	5.1	7	4.4	7	3.4	4	2.4	29	10.9	86	24.3
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	391	69.6	13	52.0	49	77.8	64	72.7	57	75.0	92	70.2	114	64.4
2 どちらともいえない	82	14.6	9	36.0	7	11.1	15	17.0	14	18.4	15	11.5	22	12.4
3 たばこと関係ない	27	4.8	2	8.0	3	4.8	5	5.7	3	3.9	7	5.3	7	4.0
4 病気を知らない	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.1
無回答	59	10.5	1	4.0	4	6.3	4	4.5	2	2.6	16	12.2	32	18.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	424	62.5	35	64.8	66	68.8	90	75.6	59	62.8	88	65.2	85	48.0
2 どちらともいえない	113	16.7	13	24.1	20	20.8	14	11.8	23	24.5	20	14.8	23	13.0
3 たばこと関係ない	61	9.0	3	5.6	7	7.3	12	10.1	10	10.6	14	10.4	15	8.5
4 病気を知らない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	80	11.8	3	5.6	3	3.1	3	2.5	2	2.1	13	9.6	54	30.5
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問22エ 喫煙が影響を及ぼす病気の認知度:気管支炎

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	835	67.1	56	70.9	118	74.2	156	75.4	118	69.4	183	68.5	201	56.8
2 どちらともいえない	192	15.4	14	17.7	27	17.0	30	14.5	39	22.9	35	13.1	47	13.3
3 たばこと関係ない	71	5.7	5	6.3	8	5.0	13	6.3	9	5.3	18	6.7	18	5.1
4 病気を知らない	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1
無回答	142	11.4	4	5.1	6	3.8	8	3.9	4	2.4	31	11.6	84	23.7
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	405	72.1	14	56.0	51	81.0	67	76.1	58	76.3	95	72.5	118	66.7
2 どちらともいえない	72	12.8	6	24.0	7	11.1	13	14.8	13	17.1	15	11.5	18	10.2
3 たばこと関係ない	26	4.6	4	16.0	3	4.8	4	4.5	3	3.9	4	3.1	8	4.5
4 病気を知らない	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7
無回答	56	10.0	1	4.0	2	3.2	4	4.5	2	2.6	17	13.0	30	16.9
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	430	63.4	42	77.8	67	69.8	89	74.8	60	63.8	88	65.2	83	46.9
2 どちらともいえない	120	17.7	8	14.8	20	20.8	17	14.3	26	27.7	20	14.8	29	16.4
3 たばこと関係ない	44	6.5	1	1.9	5	5.2	9	7.6	6	6.4	13	9.6	10	5.6
4 病気を知らない	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
無回答	83	12.2	3	5.6	4	4.2	4	3.4	2	2.1	14	10.4	54	30.5
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問22才 喫煙が影響を及ぼす病気の認知度：心臓病

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	638	51.3	40	50.6	84	52.8	129	62.3	95	55.9	147	55.1	142	40.1
2 どちらともいえない	343	27.6	27	34.2	51	32.1	57	27.5	60	35.3	65	24.3	82	23.2
3 たばこ関係ない	100	8.0	7	8.9	18	11.3	14	6.8	10	5.9	20	7.5	30	8.5
4 病気を知らない	4	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8
無回答	159	12.8	5	6.3	5	3.1	7	3.4	5	2.9	35	13.1	97	27.4
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	323	57.5	13	52.0	38	60.3	56	63.6	48	63.2	76	58.0	91	51.4
2 どちらともいえない	138	24.6	7	28.0	17	27.0	24	27.3	21	27.6	32	24.4	36	20.3
3 たばこ関係ない	40	7.1	3	12.0	6	9.5	5	5.7	5	6.6	7	5.3	14	7.9
4 病気を知らない	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1
無回答	59	10.5	2	8.0	2	3.2	3	3.4	2	2.6	16	12.2	34	19.2
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	315	46.5	27	50.0	46	47.9	73	61.3	47	50.0	71	52.6	51	28.8
2 どちらともいえない	205	30.2	20	37.0	34	35.4	33	27.7	39	41.5	33	24.4	46	26.0
3 たばこ関係ない	59	8.7	4	7.4	12	12.5	9	7.6	5	5.3	12	8.9	16	9.0
4 病気を知らない	2	0.3	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
無回答	97	14.3	3	5.6	3	3.1	4	3.4	3	3.2	19	14.1	63	35.6
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問22カ 喫煙が影響を及ぼす病気の認知度：脳卒中

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	668	53.7	44	55.7	105	66.0	146	70.5	106	62.4	141	52.8	125	35.3
2 どちらともいえない	329	26.4	23	29.1	41	25.8	44	21.3	54	31.8	70	26.2	96	27.1
3 たばこ関係ない	76	6.1	6	7.6	9	5.7	9	4.3	6	3.5	18	6.7	27	7.6
4 病気を知らない	6	0.5	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4
無回答	165	13.3	5	6.3	4	2.5	8	3.9	4	2.4	38	14.2	101	28.5
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	323	57.5	12	48.0	45	71.4	59	67.0	55	72.4	74	56.5	77	43.5
2 どちらともいえない	144	25.6	9	36.0	12	19.0	22	25.0	18	23.7	36	27.5	46	26.0
3 たばこ関係ない	26	4.6	2	8.0	4	6.3	2	2.3	2	2.6	4	3.1	12	6.8
4 病気を知らない	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7
無回答	66	11.7	2	8.0	2	3.2	5	5.7	1	1.3	17	13.0	39	22.0
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	345	50.9	32	59.3	60	62.5	87	73.1	51	54.3	67	49.6	48	27.1
2 どちらともいえない	185	27.3	14	25.9	29	30.2	22	18.5	36	38.3	34	25.2	50	28.2
3 たばこ関係ない	49	7.2	4	7.4	5	5.2	7	5.9	4	4.3	13	9.6	15	8.5
4 病気を知らない	3	0.4	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1
無回答	96	14.2	3	5.6	2	2.1	3	2.5	3	3.2	21	15.6	62	35.0
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0



問22キ 喫煙が影響を及ぼす病気の認知度:胃潰瘍

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	380	30.5	21	26.6	56	35.2	77	37.2	54	31.8	82	30.7	89	25.1
2 どちらともいえない	463	37.2	31	39.2	63	39.6	86	41.5	79	46.5	108	40.4	95	26.8
3 たばこと関係ない	212	17.0	22	27.8	33	20.8	34	16.4	26	15.3	37	13.9	59	16.7
4 病気を知らない	8	0.6	1	1.3	1	0.6	1	0.5	0	0.0	1	0.4	4	1.1
無回答	181	14.5	4	5.1	6	3.8	9	4.3	11	6.5	39	14.6	107	30.2
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	196	34.9	4	16.0	29	46.0	33	37.5	29	38.2	46	35.1	54	30.5
2 どちらともいえない	196	34.9	11	44.0	17	27.0	32	36.4	33	43.4	50	38.2	52	29.4
3 たばこと関係ない	92	16.4	9	36.0	15	23.8	19	21.6	9	11.8	16	12.2	24	13.6
4 病気を知らない	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	1.7
無回答	74	13.2	1	4.0	2	3.2	4	4.5	5	6.6	18	13.7	44	24.9
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	184	27.1	17	31.5	27	28.1	44	37.0	25	26.6	36	26.7	35	19.8
2 どちらともいえない	266	39.2	20	37.0	46	47.9	54	45.4	46	48.9	57	42.2	43	24.3
3 たばこと関係ない	120	17.7	13	24.1	18	18.8	15	12.6	17	18.1	21	15.6	35	19.8
4 病気を知らない	4	0.6	1	1.9	1	1.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6
無回答	104	15.3	3	5.6	4	4.2	5	4.2	6	6.4	21	15.6	63	35.6
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問22ク 喫煙が影響を及ぼす病気の認知度:大腸がん

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	246	19.8	20	25.3	48	30.2	59	28.5	39	22.9	35	13.1	44	12.4
2 どちらともいえない	493	39.6	29	36.7	71	44.7	86	41.5	82	48.2	113	42.3	111	31.4
3 たばこと関係ない	308	24.8	25	31.6	34	21.4	51	24.6	40	23.5	77	28.8	80	22.6
4 病気を知らない	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	4	1.1
無回答	192	15.4	5	6.3	6	3.8	10	4.8	9	5.3	42	15.7	115	32.5
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	114	20.3	4	16.0	24	38.1	24	27.3	18	23.7	20	15.3	23	13.0
2 どちらともいえない	230	40.9	7	28.0	26	41.3	31	35.2	37	48.7	56	42.7	72	40.7
3 たばこと関係ない	135	24.0	12	48.0	11	17.5	29	33.0	16	21.1	35	26.7	32	18.1
4 病気を知らない	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1
無回答	81	14.4	2	8.0	2	3.2	4	4.5	5	6.6	20	15.3	48	27.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	132	19.5	16	29.6	24	25.0	35	29.4	21	22.3	15	11.1	21	11.9
2 どちらともいえない	263	38.8	22	40.7	45	46.9	55	46.2	45	47.9	57	42.2	39	22.0
3 たばこと関係ない	172	25.4	13	24.1	23	24.0	22	18.5	24	25.5	41	30.4	48	27.1
4 病気を知らない	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.1
無回答	108	15.9	3	5.6	4	4.2	6	5.0	4	4.3	22	16.3	67	37.9
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問22ケ 喫煙が影響を及ぼす病気の認知度：妊婦への影響

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	985	79.2	74	93.7	146	91.8	194	93.7	160	94.1	203	76.0	205	57.9
2 どちらともいえない	79	6.4	2	2.5	7	4.4	7	3.4	7	4.1	23	8.6	33	9.3
3 たばこと関係ない	10	0.8	0	0.0	1	0.6	1	0.5	0	0.0	3	1.1	5	1.4
4 病気を知らない	9	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.7	6	1.7
無回答	161	12.9	3	3.8	5	3.1	4	1.9	3	1.8	36	13.5	105	29.7
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	425	75.6	22	88.0	55	87.3	79	89.8	71	93.4	94	71.8	102	57.6
2 どちらともいえない	46	8.2	2	8.0	4	6.3	6	6.8	4	5.3	12	9.2	18	10.2
3 たばこと関係ない	7	1.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	1.5	4	2.3
4 病気を知らない	7	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	5	2.8
無回答	77	13.7	1	4.0	3	4.8	3	3.4	1	1.3	21	16.0	48	27.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	559	82.4	52	96.3	91	94.8	115	96.6	89	94.7	108	80.0	103	58.2
2 どちらともいえない	33	4.9	0	0.0	3	3.1	1	0.8	3	3.2	11	8.1	15	8.5
3 たばこと関係ない	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	1	0.6
4 病気を知らない	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6
無回答	81	11.9	2	3.7	2	2.1	1	0.8	2	2.1	15	11.1	57	32.2
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問22コ 喫煙が影響を及ぼす病気の認知度：歯周病

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	520	41.8	54	68.4	103	64.8	118	57.0	81	47.6	81	30.3	82	23.2
2 どちらともいえない	366	29.4	17	21.5	38	23.9	58	28.0	57	33.5	103	38.6	93	26.3
3 たばこと関係ない	179	14.4	4	5.1	12	7.5	24	11.6	25	14.7	45	16.9	67	18.9
4 病気を知らない	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
無回答	177	14.2	4	5.1	6	3.8	7	3.4	7	4.1	38	14.2	110	31.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	240	42.7	15	60.0	40	63.5	54	61.4	39	51.3	46	35.1	45	25.4
2 どちらともいえない	162	28.8	7	28.0	14	22.2	20	22.7	24	31.6	46	35.1	51	28.8
3 たばこと関係ない	84	14.9	2	8.0	6	9.5	10	11.4	10	13.2	23	17.6	32	18.1
4 病気を知らない	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1
無回答	74	13.2	1	4.0	3	4.8	4	4.5	3	3.9	16	12.2	47	26.6
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 たばこの影響がある	280	41.3	39	72.2	63	65.6	64	53.8	42	44.7	35	25.9	37	20.9
2 どちらともいえない	204	30.1	10	18.5	24	25.0	38	31.9	33	35.1	57	42.2	42	23.7
3 たばこと関係ない	94	13.9	2	3.7	6	6.3	14	11.8	15	16.0	21	15.6	35	19.8
4 病気を知らない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	100	14.7	3	5.6	3	3.1	3	2.5	4	4.3	22	16.3	63	35.6
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問23 歯に関する症状の有無

(複数回答)	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 歯茎から出血する	154	12.4	14	17.7	26	16.4	29	14.0	30	17.6	30	11.2	23	6.5
2 歯茎がはれる	125	10.0	6	7.6	17	10.7	21	10.1	16	9.4	24	9.0	39	11.0
3 口臭が気になる	286	23.0	17	21.5	41	25.8	52	25.1	52	30.6	59	22.1	63	17.8
4 歯茎をおすと膿がでる	16	1.3	1	1.3	2	1.3	2	1.0	3	1.8	4	1.5	3	0.8
5 歯と歯のすき間が広がりものがよくつまる	566	45.5	14	17.7	51	32.1	87	42.0	88	51.8	160	59.9	162	45.8
6 歯がぐらついて硬いものが食べにくい	92	7.4	0	0.0	1	0.6	1	0.5	14	8.2	17	6.4	57	16.1
無回答	413	33.2	40	50.6	68	42.8	70	33.8	45	26.5	64	24.0	123	34.7
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	132.8	79	116.4	159	129.7	207	126.5	170	145.9	267	134.1	354	132.7

(複数回答)	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 歯茎から出血する	75	13.3	3	12.0	11	17.5	15	17.0	17	22.4	15	11.5	13	7.3
2 歯茎がはれる	58	10.3	3	12.0	6	9.5	8	9.1	7	9.2	10	7.6	24	13.6
3 口臭が気になる	137	24.4	3	12.0	16	25.4	24	27.3	27	35.5	36	27.5	30	16.9
4 歯茎をおすと膿がでる	8	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	4	3.1	3	1.7
5 歯と歯のすき間が広がりものがよくつまる	257	45.7	4	16.0	18	28.6	30	34.1	37	48.7	78	59.5	89	50.3
6 歯がぐらついて硬いものが食べにくい	57	10.1	0	0.0	1	1.6	0	0.0	7	9.2	14	10.7	35	19.8
無回答	171	30.4	15	60.0	28	44.4	32	36.4	21	27.6	24	18.3	50	28.2
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	135.6	25	112.0	63	127.0	88	123.9	76	153.9	131	138.2	177	137.8

(複数回答)	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 歯茎から出血する	79	11.7	11	20.4	15	15.6	14	11.8	13	13.8	15	11.1	10	5.6
2 歯茎がはれる	67	9.9	3	5.6	11	11.5	13	10.9	9	9.6	14	10.4	15	8.5
3 口臭が気になる	149	22.0	14	25.9	25	26.0	28	23.5	25	26.6	23	17.0	33	18.6
4 歯茎をおすと膿がでる	8	1.2	1	1.9	2	2.1	2	1.7	2	2.1	0	0.0	0	0.0
5 歯と歯のすき間が広がりものがよくつまる	306	45.1	10	18.5	33	34.4	57	47.9	51	54.3	81	60.0	73	41.2
6 歯がぐらついて硬いものが食べにくい	34	5.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	7	7.4	3	2.2	22	12.4
無回答	241	35.5	25	46.3	40	41.7	38	31.9	24	25.5	40	29.6	73	41.2
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	130.4	54	118.6	96	131.3	119	128.5	94	139.3	135	130.3	177	127.5

問24 歯間清掃用具の使用状況

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 ほぼ毎日使用している	389	31.3	8	10.1	27	17.0	40	19.3	53	31.2	117	43.8	141	39.8
2 時々使用している	395	31.8	27	34.2	70	44.0	89	43.0	57	33.5	66	24.7	85	24.0
3 使用していない	426	34.2	44	55.7	61	38.4	77	37.2	59	34.7	78	29.2	104	29.4
無回答	34	2.7	0	0.0	1	0.6	1	0.5	1	0.6	6	2.2	24	6.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 ほぼ毎日使用している	149	26.5	2	8.0	6	9.5	8	9.1	25	32.9	48	36.6	60	33.9
2 時々使用している	159	28.3	5	20.0	23	36.5	36	40.9	21	27.6	31	23.7	42	23.7
3 使用していない	237	42.2	18	72.0	34	54.0	43	48.9	29	38.2	48	36.6	64	36.2
無回答	17	3.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.3	4	3.1	11	6.2
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 ほぼ毎日使用している	239	35.3	6	11.1	21	21.9	32	26.9	28	29.8	69	51.1	81	45.8
2 時々使用している	236	34.8	22	40.7	47	49.0	53	44.5	36	38.3	35	25.9	43	24.3
3 使用していない	186	27.4	26	48.1	27	28.1	34	28.6	30	31.9	29	21.5	40	22.6
無回答	17	2.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	13	7.3
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問25 歯の本数

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 0～10本	125	10.0	0	0.0	4	2.5	5	2.4	6	3.5	19	7.1	88	24.9
2 11～19本	118	9.5	0	0.0	2	1.3	2	1.0	16	9.4	41	15.4	56	15.8
3 20～23本	145	11.7	4	5.1	12	7.5	13	6.3	23	13.5	45	16.9	46	13.0
4 24本以上	720	57.9	69	87.3	117	73.6	161	77.8	103	60.6	149	55.8	121	34.2
無回答	136	10.9	6	7.6	24	15.1	26	12.6	22	12.9	13	4.9	43	12.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0
平均値→	22.9		27.6		26.4		26.6		24.3		22.8		17.7	

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 0～10本	67	11.9	0	0.0	2	3.2	3	3.4	3	3.9	13	9.9	45	25.4
2 11～19本	60	10.7	0	0.0	1	1.6	1	1.1	9	11.8	22	16.8	27	15.3
3 20～23本	73	13.0	3	12.0	8	12.7	6	6.8	9	11.8	26	19.8	21	11.9
4 24本以上	291	51.8	21	84.0	42	66.7	65	73.9	43	56.6	62	47.3	58	32.8
無回答	71	12.6	1	4.0	10	15.9	13	14.8	12	15.8	8	6.1	26	14.7
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0
平均値→	22.1		27.6		26.0		26.4		24.1		21.7		17.3	

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 0～10本	57	8.4	0	0.0	2	2.1	2	1.7	3	3.2	6	4.4	43	24.3
2 11～19本	56	8.3	0	0.0	1	1.0	1	0.8	7	7.4	18	13.3	29	16.4
3 20～23本	71	10.5	1	1.9	4	4.2	7	5.9	14	14.9	19	14.1	25	14.1
4 24本以上	429	63.3	48	88.9	75	78.1	96	80.7	60	63.8	87	64.4	63	35.6
無回答	65	9.6	5	9.3	14	14.6	13	10.9	10	10.6	5	3.7	17	9.6
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0
平均値→	23.6		27.6		26.7		26.7		24.5		23.9		18.0	

問26 定期的な歯石除去や歯面清掃の有無

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 はい	626	50.3	29	36.7	82	51.6	95	45.9	87	51.2	140	52.4	191	54.0
2 いいえ	592	47.6	50	63.3	77	48.4	111	53.6	81	47.6	123	46.1	145	41.0
無回答	26	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.2	4	1.5	18	5.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 はい	244	43.4	4	16.0	26	41.3	33	37.5	32	42.1	60	45.8	89	50.3
2 いいえ	306	54.4	21	84.0	37	58.7	54	61.4	42	55.3	69	52.7	81	45.8
無回答	12	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	2.6	2	1.5	7	4.0
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 はい	380	56.0	25	46.3	56	58.3	62	52.1	55	58.5	79	58.5	102	57.6
2 いいえ	284	41.9	29	53.7	40	41.7	57	47.9	39	41.5	54	40.0	64	36.2
無回答	14	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	11	6.2
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問27 かかりつけ医の状況

(複数回答)	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 かかりつけ医がある	804	64.6	36	45.6	80	50.3	101	48.8	104	61.2	200	74.9	278	78.5
2 かかりつけ歯科医がある	539	43.3	25	31.6	51	32.1	79	38.2	64	37.6	117	43.8	201	56.8
3 かかりつけ薬局がある	149	12.0	10	12.7	19	11.9	13	6.3	16	9.4	35	13.1	56	15.8
4 持っていない	246	19.8	32	40.5	49	30.8	71	34.3	38	22.4	30	11.2	25	7.1
無回答	7	0.6	0	0.0	2	1.3	1	0.5	1	0.6	0	0.0	2	0.6
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	140.3	79	130.4	159	126.4	207	128.1	170	131.2	267	143.0	354	158.8

(複数回答)	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 かかりつけ医がある	338	60.1	11	44.0	21	33.3	35	39.8	41	53.9	91	69.5	138	78.0
2 かかりつけ歯科医がある	203	36.1	5	20.0	14	22.2	28	31.8	21	27.6	44	33.6	91	51.4
3 かかりつけ薬局がある	53	9.4	3	12.0	4	6.3	2	2.3	4	5.3	13	9.9	27	15.3
4 持っていない	146	26.0	12	48.0	29	46.0	41	46.6	25	32.9	20	15.3	18	10.2
無回答	4	0.7	0	0.0	2	3.2	1	1.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	132.3	25	124.0	63	111.0	88	121.6	76	121.0	131	128.3	177	154.9

(複数回答)	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 かかりつけ医がある	463	68.3	25	46.3	59	61.5	66	55.5	63	67.0	108	80.0	140	79.1
2 かかりつけ歯科医がある	334	49.3	20	37.0	37	38.5	51	42.9	43	45.7	72	53.3	110	62.1
3 かかりつけ薬局がある	96	14.2	7	13.0	15	15.6	11	9.2	12	12.8	22	16.3	29	16.4
4 持っていない	100	14.7	20	37.0	20	20.8	30	25.2	13	13.8	10	7.4	7	4.0
無回答	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	146.9	54	133.3	96	136.4	119	132.8	94	139.3	135	157.0	177	162.7

問28 市のがん検診の認知度

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 はい	1,026	82.5	46	58.2	117	73.6	162	78.3	137	80.6	239	89.5	320	90.4
2 いいえ	208	16.7	32	40.5	42	26.4	43	20.8	33	19.4	28	10.5	28	7.9
無回答	10	0.8	1	1.3	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 はい	417	74.2	8	32.0	34	54.0	52	59.1	51	67.1	108	82.4	163	92.1
2 いいえ	141	25.1	16	64.0	29	46.0	35	39.8	25	32.9	23	17.6	12	6.8
無回答	4	0.7	1	4.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 はい	605	89.2	38	70.4	83	86.5	110	92.4	86	91.5	130	96.3	157	88.7
2 いいえ	67	9.9	16	29.6	13	13.5	8	6.7	8	8.5	5	3.7	16	9.0
無回答	6	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	4	2.3
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問29① 健康寿命の認知度

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	487	39.1	28	35.4	42	26.4	56	27.1	63	37.1	132	49.4	163	46.0
2 言葉は知っているが意味は知らない	311	25.0	25	31.6	40	25.2	43	20.8	41	24.1	64	24.0	96	27.1
3 知らない	436	35.0	26	32.9	77	48.4	107	51.7	66	38.8	68	25.5	90	25.4
無回答	10	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	1.1	5	1.4
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	202	35.9	7	28.0	17	27.0	17	19.3	26	34.2	49	37.4	85	48.0
2 言葉は知っているが意味は知らない	151	26.9	11	44.0	15	23.8	19	21.6	17	22.4	43	32.8	46	26.0
3 知らない	205	36.5	7	28.0	31	49.2	51	58.0	33	43.4	38	29.0	44	24.9
無回答	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.8	2	1.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	283	41.7	21	38.9	25	26.0	39	32.8	37	39.4	83	61.5	78	44.1
2 言葉は知っているが意味は知らない	160	23.6	14	25.9	25	26.0	24	20.2	24	25.5	21	15.6	50	28.2
3 知らない	229	33.8	19	35.2	46	47.9	56	47.1	33	35.1	29	21.5	46	26.0
無回答	6	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	3	1.7
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問29② COPD(慢性閉塞性肺疾患)の認知度

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	215	17.3	19	24.1	24	15.1	40	19.3	34	20.0	51	19.1	47	13.3
2 言葉は知っているが意味は知らない	248	19.9	13	16.5	24	15.1	23	11.1	33	19.4	67	25.1	87	24.6
3 知らない	771	62.0	47	59.5	111	69.8	143	69.1	103	60.6	149	55.8	212	59.9
無回答	10	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	8	2.3
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	90	16.0	5	20.0	10	15.9	9	10.2	16	21.1	21	16.0	29	16.4
2 言葉は知っているが意味は知らない	100	17.8	4	16.0	12	19.0	8	9.1	11	14.5	29	22.1	36	20.3
3 知らない	368	65.5	16	64.0	41	65.1	70	79.5	49	64.5	81	61.8	109	61.6
無回答	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	3	1.7
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	125	18.4	14	25.9	14	14.6	31	26.1	18	19.1	30	22.2	18	10.2
2 言葉は知っているが意味は知らない	148	21.8	9	16.7	12	12.5	15	12.6	22	23.4	38	28.1	51	28.8
3 知らない	399	58.8	31	57.4	70	72.9	73	61.3	54	57.4	67	49.6	103	58.2
無回答	6	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問29③ メタボリックシンドロームの認知度

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	1,070	86.0	73	92.4	146	91.8	194	93.7	159	93.5	241	90.3	253	71.5
2 言葉は知っているが意味は知らない	118	9.5	6	7.6	13	8.2	11	5.3	11	6.5	21	7.9	54	15.3
3 知らない	51	4.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	5	1.9	44	12.4
無回答	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	3	0.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	478	85.1	25	100.0	58	92.1	81	92.0	71	93.4	113	86.3	129	72.9
2 言葉は知っているが意味は知らない	55	9.8	0	0.0	5	7.9	5	5.7	5	6.6	14	10.7	25	14.1
3 知らない	27	4.8	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	4	3.1	22	12.4
無回答	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	589	86.9	48	88.9	88	91.7	113	95.0	88	93.6	127	94.1	124	70.1
2 言葉は知っているが意味は知らない	63	9.3	6	11.1	8	8.3	6	5.0	6	6.4	7	5.2	29	16.4
3 知らない	23	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	22	12.4
無回答	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0

問29④ ロコモティブシンドロームの認知度

	全体		20歳代		30歳代		40歳代		50歳代		60歳代		70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	130	10.5	8	10.1	15	9.4	24	11.6	18	10.6	32	12.0	33	9.3
2 言葉は知っているが意味は知らない	187	15.0	10	12.7	17	10.7	19	9.2	17	10.0	61	22.8	62	17.5
3 知らない	909	73.1	61	77.2	127	79.9	162	78.3	134	78.8	171	64.0	248	70.1
無回答	18	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.6	3	1.1	11	3.1
n(回答者数)/構成比(%)の合計	1,244	100.0	79	100.0	159	100.0	207	100.0	170	100.0	267	100.0	354	100.0

	男性		男性20歳代		男性30歳代		男性40歳代		男性50歳代		男性60歳代		男性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	51	9.1	3	12.0	4	6.3	6	6.8	8	10.5	11	8.4	19	10.7
2 言葉は知っているが意味は知らない	80	14.2	5	20.0	10	15.9	4	4.5	5	6.6	28	21.4	28	15.8
3 知らない	425	75.6	17	68.0	49	77.8	77	87.5	63	82.9	92	70.2	125	70.6
無回答	6	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	5	2.8
n(回答者数)/構成比(%)の合計	562	100.0	25	100.0	63	100.0	88	100.0	76	100.0	131	100.0	177	100.0

	女性		女性20歳代		女性30歳代		女性40歳代		女性50歳代		女性60歳代		女性70歳以上	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1 知っている	79	11.7	5	9.3	11	11.5	18	15.1	10	10.6	21	15.6	14	7.9
2 言葉は知っているが意味は知らない	107	15.8	5	9.3	7	7.3	15	12.6	12	12.8	33	24.4	34	19.2
3 知らない	480	70.8	44	81.5	78	81.3	85	71.4	71	75.5	78	57.8	123	69.5
無回答	12	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	3	2.2	6	3.4
n(回答者数)/構成比(%)の合計	678	100.0	54	100.0	96	100.0	119	100.0	94	100.0	135	100.0	177	100.0